Cuidados após o procedimento

Toxina botulínica tipo A para estética facial

Guarde este guia e a identificação do produto ou equipamento recebido. As orientações individuais e os contatos devem ser preenchidos antes de sair. Sinais de emergência têm prioridade sobre qualquer data de retorno.

Paciente: _____ Data do procedimento: _____

Profissional: (nome) _____ (profissão) _____

(número do conselho e UF): _____ Serviço: _____

(endereço completo): _____

Contato: _____ Urgência fora do horário: _____

Quando procurar ajuda sem esperar

Dificuldade para engolir, engasgos novos, dificuldade de falar ou respirar e fraqueza generalizada ou progressiva exigem atendimento de emergência imediato, mesmo horas a semanas após a aplicação. Acione o SAMU 192 ou vá à emergência sem dirigir; informe o uso de toxina e os dados do medicamento. Não espere a consulta ou a resposta da clínica.

Inchaço súbito de língua ou garganta, falta de ar, chiado ou desmaio associado a reação alérgica também exigem emergência imediata. Acione o SAMU 192 e não aguarde resposta da clínica.

Visão embaçada, visão dupla ou dificuldade de fechar os olhos requer avaliação rápida. Perda súbita da visão ou sinais neurológicos graves exigem emergência. Não use colírio ou outro medicamento sem prescrição.

O que observar no início

Picadas, pequeno hematoma e desconforto podem ocorrer. O efeito muscular evolui nos dias seguintes. Não repita aplicação porque o efeito ainda não apareceu. Queda de pálpebra, alteração do sorriso ou sintomas oculares precisam de avaliação.

Cuidados em casa e seu acompanhamento

Não massageie nem esfregue intensamente as regiões tratadas por iniciativa própria. Não é necessário manter contrações repetidas nem ficar imóvel para tentar “fixar” o medicamento. Siga as orientações específicas da bula e do seu atendimento.

Mantenha as mãos limpas e a higiene suave. Evite fricção e trauma. Proteja a pele do sol sem irritar a área.

Não cubra pontos de entrada ainda abertos com maquiagem; retome cosméticos conforme a condição da pele e a orientação recebida.

Não é necessário ficar acordado, imóvel ou contrair repetidamente a face. Orientações sobre atividade física devem ser compatíveis com a bula e o atendimento; não há regra universal de permanecer quatro horas sem deitar que garanta prevenção de complicações. Evite pressão e fricção intensa no local conforme orientado.

Não suspenda remédios prescritos por conta própria e não inicie antibiótico, corticoide, anti-inflamatório ou outro medicamento para tratar uma alteração sem avaliação. Informe infecção e procedimentos odontológicos ou estéticos programados; não adie atendimento necessário sem orientação.

Produto apresentação ou modelo recebido: _____

Registro Anvisa e lote: _____

Data de fabricação e validade: _____

Dose total em unidades desta formulação e data: _____

Regiões tratadas e identificação de rastreabilidade entregue: _____

Higiene maquiagem exercício e cuidados específicos: _____

Outros cuidados específicos e prazo: _____

Receita entregue e outras orientações: _____

Revisão: _____ Referência de urgência: _____

Paciente e assinatura: _____ Data e hora: _____

Profissional conselho e assinatura: _____